

# A TÁVOLSÁGRÓL ÉS A SEBESSÉGRŐL, A HUBBLE-TÖRVÉNY KAPCSÁN

Bokor Nándor  
BME Fizikai Intézet

A távolság és a sebesség alapvető fizikai fogalmaink közé tartoznak. Használatuk mindennapi életünket is átszövi, és az olyan mondatok, mint például „Szombathely 112 km távolságra van Győrújbaráttól”, „A gyalogkakukk maximális sebessége 32 km/h, a prérifarkasé 69 km/h” eldönthető igazságtartalommal bírnak. Hajlamosak vagyunk magától értetődőnek tekinteni, hogy ez a jól definiáltság minden körülmények között megmarad. A természettudomány bizonyos ágai, különösen a relativitáselmélet és a kvantummechanika ugyanakkor arra tanítanak bennünket, hogy a mindennapi tapasztalatainkból évek alatt felépített intuíciónk néha a legalapvetőbb fizikai fogalmakkal kapcsolatban is csődöt mondhat, például ha az adott kísérlet méretskálája, a benne résztvevő objektumok mozgási gyorsasága jelentősen kívül van a megszokott értéktartományokon.

A Hubble-törvény *nagyon* távoli és *nagyon* gyorsan mozgó objektumokra vonatkozik, érdemes tehát megvizsgálni, hogy helyesen járunk-e el, ha naivan, mindennapi intuíciónk alapján próbáljuk értelmezni. A Hubble-törvényt általában ilyen formában szokás írni:

$$v = H_0 d, \quad (1)$$

ahol  $v$  egy távoli galaxis távoldási sebessége,  $d$  pedig a galaxis távolsága tőlünk.  $H_0$  az úgynevezett Hubble-állandó, ami nem olyan értelemben állandó, hogy a Világegyetem története során nem változott (nagyon is változott, hiszen az aktuális értékét a Friedman–Robertson–Walker-metrika  $a(t)$  skálafaktorának időfüggése határozza meg a

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}$$

összefüggés szerint), hanem hogy „egy adott korban” a Világegyetem különböző helyein ugyanakkora. Talán helyesebb tehát, amikor  $H_0$ -t a „Hubble-paraméter jelenlegi értékének” nevezzük.

A fenti bekezdésben említett Friedman–Robertson–Walker-metrika általános alakja:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t) \left( \frac{dr^2}{1 - k r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\varphi^2 \right), \quad (2)$$

ahol  $k$  értéke attól függ, hogy a Világegyetem térídeje globális léptékben gömbi ( $k = 1$ ), sík ( $k = 0$ ) vagy hiperbolikus-e ( $k = -1$ ),  $t$  pedig a „globális időkoordináta”. Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti metrika által használt koordináta-rendszer önkényes választás eredménye, például az időszerű koordinátát másképp is definiálhattuk volna. Koordináta-rendszerünket úgy vesszük fel, hogy az  $r = 0$  pontban van a galaxisunk

(kicsit precízebben: az  $r = 0$  koordinátával rendelkező események a galaxisunkban történnek).

A Hubble-törvény szövegesen megfogalmazva tehát látszólag így hangzik: „Egy távoli galaxis távoldási sebessége a tőlünk mért távolságával egyenesen arányos.” Mennyire szabad komolyan venni ezt a mondatot? Egyáltalán: mennyire szabad az (1) egyenletet komolyan venni? Ha szó szerint értelmezzük, akkor zavarbaejtő következtetésekre kényszerülünk. Az (1) egyenletből például egy olyan galaxis távoldási sebességére, amely elég távol van tőlünk ( $d > 5$  Gparsec),  $v > c$  adódik. Hogyan lehetséges, hogy az Univerzum tágulása közben egyes galaxisok sebessége egyszerűen csak átlépje a fénysebességet? Egy másik zavarbaejtő gondolat lehet a következő: ha a galaxisok mozgása geodetikusan történik, sőt (jó közelítéssel) mind állandó  $(r, \varphi, \theta)$  koordinátákkal rendelkeznek, akkor egyáltalán milyen értelemben mozognak hozzánk képest?

Az alábbiakban arról szeretném meggyőzni az olvasót, hogy nem csak a Hubble-törvény fenti megfogalmazását nem szabad komolyan venni, de – az Univerzum globális léptékében – már a távolság és sebesség fogalmait sem.

## A sebességről

A sebesség pongyola definiálása már sík téridő kis léptékű tartományaiban is vezethet zavarbaejtő és hamis eredményre [1]. Tekintsünk például egy  $K$  inerciarendszert, amelyben az  $x$ -tengely mentén balra repül egy űrhajó  $-0,8c = -240\,000$  km/s sebességgel, jobbra pedig egy másik űrhajó  $+0,8c = +240\,000$  km/s sebességgel. Úgy képzelhetjük, hogy  $K$ -ban egy-egy esemény téridőbeli koordinátáit kockarácsszerűen elhelyezett méterrudak és a rácpontokba tett szinkronizált órák segítségével mérjük [2]. Így két esemény közötti távolság és időtartam mérésének módszere, ezzel pedig egy tömegpont sebességének mérési módszere is egyszerűen adódik. Mekkora a példánkban szereplő két űrhajó *egymáshoz viszonyított* sebessége? A naiv sebességösszeadás alkalmazása, amely az  $1,6c = 480\,000$  km/s eredményt adja, teljesen indokoltnak tűnik. Hiszen a két űrhajó közötti távolság *valóban* 480 000 km-rel nő 1 másodperc időtartam alatt, ahol mind a távolságot, mind az időtartamot a gondosan definiált módon, a  $K$  inerciarendszerben mérjük. De jelenti-e ez azt, hogy a jobb oldali űrhajó a féynél gyorsabban távolodik a bal oldalitól? Természetesen nem. Ha így lenne, akkor a bal oldali űrhajóból korábban jobbra kilőtt fényimpulzust a jobbra repülő űrhajó előbb-utóbb utolérné és megelőzné. Ez azonban nem történik meg (ezt beláthatjuk a  $K$ -beli

nézőpontból, amelyben a fényimpulzus  $+c$ -vel halad, az űrhajó pedig csak  $+0,8 c$ -vel). Milyen értelemben lesz tehát az űrhajók közötti relatív sebesség  $1,6 c$ ? *Semmilyen* értelemben. A hibát ott követtük el, hogy egyáltalán sebességnek neveztük azt a mennyiséget, amelyet a fenti módon a távolság és az időtartam hányadosaként kaptunk. Ahhoz, hogy egy tárgy másik tárgyhoz viszonyított sebességének érvényes fizikai értelme legyen, azon tárgy *nyugalmi* vonatkoztatási rendszerébe kell helyezkednünk, amelyhez képest a másik mozgását tárgyaljuk. Ebben a nyugalmi rendszerben kell szinkronizált órák és méterrudak kockarács-hálózatát (legalábbis képzeletben) felépítenünk, hogy a sebességmérést elvégezhessük. A balra repülő űrhajó  $K'$  nyugalmi rendszerének szinkronizált órái és méterrudai azonban nem azonosak a  $K$  óráival és méterrudaival. Ezért nem nagyon kell meglepődnünk azon, hogy a kétféle sebességmérés eredménye sem lesz ugyanaz: levezethető, hogy a  $K'$ -ből mérve az űrhajók közötti távolság 1 másodperc alatt csak 292 683 km-rel nő. Az űrhajók relatív sebessége tehát a helyes értelmezés szerint  $292\,683\text{ km/s} = 0,976 c$ .

A fenti példa azt illusztrálta, hogy a sebesség fogalmának nem gondos definiálása még sík téridőben zajló mozgások leírásakor is zavart okozhat. Görbült téridőben – mint amilyen a Világegyetem a Hubble-törvény által leírt tartományban – még jobban meg kell gondolnunk, mit érthetünk távolság és sebesség alatt.

## A távolságról

Ahhoz, hogy egy távoli (esetleg mozgó) objektumtól való távolságunkat értelmezni tudjuk, az objektum pozícióját a saját pozíciónkkal *ugyanabban az időpontban* kell összevetni. Már a speciális relativitáselméletből tudjuk, hogy az egyidejűség fogalma nem abszolút, és ez rögtön előrevetíti, hogy a távolság definiálása elvileg is problematikus lesz. Sík téridőben a problémát el tudjuk kerülni azzal, hogy saját pozíciónkat – a sebességméréshez hasonló gondolatmenet alapján – *nyugvónak* tekintjük. A saját *pillanatnyi nyugalmi inerciarendszerünk* egy adott időpillanatában határozzuk meg a távoli objektum pozícióját, és az így kapott értéket tekintjük az objektum adott pillanatban tőlünk mért távolságának (ezt elképzelve úgy, hogy a szinkronizált órák és méterrudak már említett derékszögű hálózatában a távoli objektum pozícióját az adott pillanatban vele egy helyen levő óra regisztrálja, majd utána egyszerűen leszámoljuk a regisztrálást végző óráig húzott egyenes mentén a méterrudak számát). Ehhez azonban az kell, hogy a téridő olyan óriási darabját, amely a mi világvonalunkat és a távoli objektum világvonalát is tartalmazza, le tudjuk fedni *egyetlen globális inerciarendszerrel* (egyetlen szinkronizált órákból és derékszögben elhelyezett méterrudakból álló kockarácscsal).

Görbült téridőben ez nem megy. A téridő görbültsége éppen azt jelenti, hogy nem létezik olyan inerciarendszer, amely átfogja a téridő globálisan nagy

tartományait. Csak lokálisan, síknak tekinthető téridő-tartományokban tudunk szinkronizált órákból és méterrudakból (képzeletben) kockarácscsal alkotni. Egy ilyen lokális rácshálózat általános esetben nem tud kiterjedni olyan méretűre, hogy a távoli objektum világvonala beleférjen.

A távolságméréskor fellépő nehézségeink ezért nem technológiai, hanem elvi, geometriai jellegűek: a görbült téridő két távoli eseménye között az egyidejűség fogalmának nincs *jelentése*. Ebből következően egy távoli objektum tőlünk mért *távolságának* sincs egyértelmű jelentése, még akkor sem, ha saját pozíciónkat nyugvónak vesszük. Gyakran hallunk ugyan olyan adatokat, amelyek galaxisok távolságát adják meg (például milliárd fényévekben), azonban tudnunk kell, hogy ezek a számadatok csak az – általában hallgatólagosan hozzájuk fűzött, és a csillagászok által észben tartott – „használati útmutatóval” együtt jelentenek valamit. A Világegyetem nagyléptékű tartományaiiban az alábbi ötféle távolságfogalom [3] használatos a csillagászatban

### 1. Sajáttávolság (*proper distance*)

Úgy teszünk, mintha a sík téridőben megszokott, egyidejűségen alapuló távolságmérés itt is minden további nélkül működne. A (2)-ben szereplő „globális időkoordináta” jelenlegi értéke mellett ( $t = t_0$ ,  $dt = 0$ )  $r$ -irányban ( $d\varphi = 0$ ,  $d\theta = 0$ ) a kérdéses távoli galaxis  $r_0$ -koordinátájáig integráljuk  $ds$ -t:

$$d_s \equiv a(t_0) \int_0^{r_0} \frac{dr}{\sqrt{1 - k r^2}}. \quad (3)$$

Az így kapott távolságdimenziójú mennyiséget közvetlenül mérni nem lehet, de – adott kozmológiai modellt (adott  $k$  értéket és  $a(t)$  függvényt) feltételezve – értéke némi számolás után megkapható a galaxis fényének közvetlenül is mérhető vöröseltolódásából. Az úgynevezett Einstein–de Sitter-modellből –  $k = 0$ ,  $a(t) = a(t_0)(t/t_0)^{2/3}$  – például a

$$d_s = 2H_0 \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{1+z}} \right)$$

képlet adódik, ahol  $z \equiv \Delta\lambda/\lambda$  a távoli galaxis fényének mért vöröseltolódása.

### 2. Fényesség-távolság (*luminosity distance*)

Ezt a távolságfogalmat használta eredetileg *Edwin Hubble*, amikor híres törvényét felállította. Ezen adat meghatározásához a galaxis látszólagos fényintenzitását és a vöröseltolódását is mérni kell. Feltesszük, hogy a galaxisok tényleges fényessége a Világegyetemben mindenhol ugyanakkora, azaz szabvány „gyertyaként” használhatóak. Sík, statikus univerzumban egy galaxis *látszólagos* fényintenzitása fordítottan arányos tőlünk mért távolságának négyzetével. Tágu-ló világegyetem esetén a látszólagos fényintenzitást csökkenti a kozmológiai vöröseltolódás – amely miatt minden beérkező foton energiája  $(1+z)$ -szeresen – és

az, hogy a tágulás miatt egységnyi idő alatt a távcsö-  
vünkbe kisebb számú foton csapódik be, mint tágulás  
nélkül csapódna (ami szintén  $(1+z)$ -szeres intenzitás-  
csökkenést ad). Megmutatható, hogy összességében a  
fényesség-távolság és a saját-távolság között a

$$d_F = (1+z) d_S$$

összefüggés áll fenn.

### 3. Szögátmérő-távolság

Feltesszük, hogy a galaxisok mérete az Univerzum-  
ban mindenhol ugyanakkora, tehát szabvány „méter-  
rúdként” használhatók. Szögátmérő-távolságuk ekkor  
látszólagos szögátmérőjükből határozható meg. Meg-  
mutatható, hogy táguló világegyetem esetén ez a tá-  
volságfogalom adja a legkisebb numerikus értéket, és  
kapcsolata az eddigi kettő távolságfogalommal:

$$d_{sz} = \frac{d_S}{1+z} = \frac{d_F}{(1+z)^2}$$

### 4. Sajátmozgás-távolság

Ha egy galaxis nem sugárirányban távolodik tőlünk, akkor – nem túl távoli galaxis esetén – definiál-  
ható a hozzánk képesti úgynevezett transzverz sebessége [3]. Ha ez ismert, és a vöröseltolódásból meg-  
tudjuk állapítani a galaxis úgynevezett sajátmozgását [3] is, akkor ezekből meghatározható egyfajta távol-  
ságfogalom. Erre az adódik, hogy

$$d_{SM} = d_S.$$

### 5. Fényterjedés-távolság


Az úgynevezett visszatekintési idő alatt a Friedman–  
Robertson–Walker-metrika  $t$ -koordinátájának megvál-  
tozását értjük az adott galaxisból elinduló fény kibocsá-  
tási eseménye és ugyanennek a fénynek a földi detek-  
tálási eseménye között. Ha ezt a  $t$ -koordinátakülönbsé-  
get besorozzuk a fénysebességgel, újabb távolságfo-  
galomhoz jutunk. Ennek számértéke a feltételezett koz-  
mológiai modelltől függ. Levezethető, hogy például  
Einstein–de Sitter-modell esetén az alábbi módon hatá-  
rozható meg a mért vöröseltolódásból:

$$d_{FT} = \frac{2}{3} H_0 \left( 1 - \frac{1}{(1+z)^{3/2}} \right).$$

Az 5-féle távolságfogalom kis  $z$  (közeli galaxisok)  
esetén azonos számértéket ad, nagy vöröseltolódásnál  
viszont már nagy lesz közöttük az eltérés. Ha például  
a vöröseltolódás értéke  $z = 2$ ,  $d_F$  és  $d_{sz}$  között 9-szeres  
eltérés adódik!

## Még egyszer a sebességről

Egy tömegpont teljes élettörténete benne foglaltatik a  
tömegpont *világvonalában*. Most tekintsünk két tö-  
megpontot. Mozognak-e egymáshoz képest? A leg-



1. ábra. A vektor orientációját megőrző párhuzamos eltolás lehetet-  
lenségének – hiszen az eredmény a használt főkörtől függ – szem-  
léltetése.

egyszerűbb akkor válaszolni erre a kérdésre, ha ab-  
ban a pillanatban vagyunk kíváncsiak a válasza, ami-  
kor a tömegpontok éppen egy helyen vannak. Ekkor  
világvonaluk metszi egymást, és a metszési pontban  
(a találkozási eseményben) közvetlenül összehason-  
lítható a két világvonal iránya a téridőben. Kicsit pre-  
cízebben, a világvonalak adott eseménybeli, normált  
érintővektorai – ezek a két tömegpont úgynevezett  
négyessebesség-vektorai – közvetlenül összevethe-  
tők. Az összehasonlítás eredménye: ha a két négyes-  
sebesség-vektor *párhuzamos* a téridőben, akkor a két  
tömegpont egymáshoz képest áll, ha pedig a négyes-  
sebesség-vektorok a téridőnek nem azonos irányában  
állnak, akkor a két tömegpont egymáshoz képest mo-  
zog. Ez utóbbi esetben a vektorok relatív orientációjá-  
ból számszerűen is megkapható a tömegpontok rela-  
tív sebessége. A nehézség akkor kezdődik, ha a tár-  
gyak, amelyeknek egymáshoz képesti mozgását meg-  
akarjuk állapítani, nem egy helyen vannak. Most az  
egyidejűség relativitásának problémáját tegyük félre  
(erről fent már volt szó)! Hogyan lehet két olyan vek-  
tor orientációját összevetni, amelyek a téridőnek nem  
azonos eseményében vannak? A válasz: általános  
esetben sehogy. Hogy ezt belássuk, használjuk a két-  
dimenziós felületek analógiáját. Egy gömbfelület (ez  
most az univerzumunk, harmadik dimenzió nincs,  
minden objektum a felületben létezik) két különböző  
pontján van két vektor. Párhuzamosak-e? Ha nem,  
mekkora szöget zárnak be egymással? E kérdéseknek,  
mint látni fogjuk, nincs értelme. A két vektort csak ak-  
kor tudjuk összehasonlítani, ha az egyiket „odavisz-  
szük” a másik helyére, és gondosan ügyelünk, hogy  
közben orientációja (nem a 3D nézőpontunk szerinti  
állása, hanem a laposlények számára megjelenő  
orientációja) ne változzon. Azonban a differenciálgeo-  
metriából ismert, hogy a vektor orientációját megőrző  
úgynevezett párhuzamos eltolás [4] ebben a formában

nem jól definiált fogalom, mert az eredmény – a végpontba érkező vektor orientációja – attól függ, milyen görbe mentén végeztük a párhuzamos eltolást. Ezt az 1. ábra szemlélteti.

Az **a** és **b** jelű vektorok távol vannak egymástól, itt speciálisan a gömbfelület két átellenes pontján. A gömbfelületen élő laposlények arra kíváncsiak, mekkora szöveget zár be egymással az **a** és **b** vektor. Ahhoz, hogy ezt eldöntsék, a **b** jelű vektort valamilyen vonal mentén párhuzamos eltolással (orientáció-megőrző módon) kell az **a** helyére vinniük. De az *A* és *B* helyeket végtelen sok vonallal összeköthetik, sőt ebben a példában még a gömbfelület egyenesei – a főkörök – közül is végtelen sok köti össze a két pontot. Nincs semmi, ami bármelyik főkört a többihez képest kitüntetné, viszont az eredmények a használt főkörtől függően drasztikusan eltérőek lesznek. Mekkora tehát a két vektor által bezárt szög? Ha a laposlények a folytonos vonallal jelölt főkört használják a párhuzamos eltoláshoz, akkor a kapott válasz  $0^\circ$ , ha a pontozottat, akkor  $180^\circ$ , ha a szaggatottat, akkor  $90^\circ$ . Tanulság: magának a kérdésnek nem volt értelme.

Teljesen analóg a helyzet négyessebesség-vektorok összehasonlításával görbült téridőben. Nyugodalomban van-e egymáshoz képest két távoli objektum? Ha nem, milyen sebességgel mozognak egymáshoz képest? E kérdéseknek pontosan azért nincs értelme, amiért az 1. ábra két távoli vektorának párhuzamosságáról vagy bezárt szögéről sincs értelme beszélni. A távoli galaxis négyessebesség-vektorának és a mi galaxisunk négyessebesség-vektorának relatív orientációját úgy tudnánk megállapítani, ha a távoli vektort párhuzamos eltolással a téridőnek abba az eseményé-

be vinnénk, ahol a mi galaxisunk most van. Ez azonban éppúgy rosszul definiált feladat, mint a fenti két-dimenziós példa.

## Összefoglalás

A Hubble-törvény komoly pedagógiai értéke, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a távolság és a sebesség fogalmai görbült téridőben problematikusak. Mivel ezen empirikus törvény köznyelvi megfogalmazása épp a távolság és sebesség szavakat használja, nem csoda, hogy naiv értelmezése félreértésekhez vezet. Megóvhatjuk diákjainkat ezektől a félreértésektől, ha gondoskodunk róla, hogy ne az (1) egyenlet által sugallt mentális kép éljen bennük. Ne úgy vizualizálják a Hubble-törvényt, mint ami egy galaxis „távolsága” és „sebessége” között teremt kvantitatív kapcsolatot. Helyesebb, ha úgy gondolnak rá, mint az adott galaxis *látszólagos fényessége* és fényének *vöröseltolódása* között felfedezett kvantitatív kapcsolatra. A képlet ekkor ugyan bonyolultabb, mint az (1) egyenlet, ráadásul konkrét alakja a használt kozmológiai modelltől függ, de nem súlyos ez az ár, ha cserébe világosabb fizikai intuíciót kapunk.

## Irodalom

1. Ali Kaya: Hubble's law and faster than light expansion speeds. *Am. J. Phys.* 79/11 (2011) 1151.
2. Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler: *Téridőfizika*. Typotex, Budapest, 2006.
3. Stephen Webb: *Measuring the Universe – The Cosmological Distance Ladder*. Springer, 1999.
4. Bokor Nándor, Laczik Bálint: Vektorok párhuzamos eltolásának szemléltetése I. *Fizikai Szemle* 61/7–8 (2011) 240.

# SUGÁRVÉDELEM A VILÁGŪRBEN

Hirn Attila, Pázmándi Tamás, Deme Sándor  
MTA Energiatudományi Kutatóközpont

2012 augusztusában ünnepeltük századik évfordulóját annak, hogy *Victor Franz Hess* osztrák fizikus (1. ábra) hidrogénnel töltött ballon fedélzetén végzett mérései során felfedezte a kozmikus sugárzást [1]. Bár az ezt követő évtizedekben is számos figyelemre méltó

1. ábra. V. F. Hess felbocsátás előtt, a ballon kosarában.



A 2013. évi Magyar Fizikus Vándorgyűlésen elhangzott előadás írott változata.

A Nemzetközi Űrállomás Columbus modulján végrehajtott TRITEL kísérlet az Európai Unió 6. Keretprogramja terhére meghirdetett SURE program keretében (RITA-CT-2006-026069), a 98057 és a 4000108072/13/NL/KML számú ESA PECS együttműködéseknek köszönhetően valósult meg. Köszönet illeti továbbá a kísérlet két külföldi társkutatóját, *Sönke Burmeister*t (Kieli Egyetem) és *Günther Reitzel*t (Német Légiközlekedési és Űrepülési Központ) a fejlesztés és a kiértékelés során nyújtott segítségükért és együttműködésükért.

Az ISS orosz szegmensén üzemelő TRITEL rendszer fejlesztése és megépítése a Magyar Űrkutatási Iroda támogatásával, valamint intézeti forrásból valósult meg. Az IBMP és az MTA EK közti kutatói mobilitást a Magyar Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia közötti kétoldalú együttműködés segítette elő.