

1885. october havi orvosi szakülés jegyzőkönyve.

1. Engel Gábor egyet. m. tanár „Az országos gyermek-menházakról, tekintettel a kolozsvári kir. szülőintézet által ápolásra kiadott gyermekekre“ tart előadást. Az előadás előző füzetünkben egész terjedelmében megjelent.

2. Engel Gábor egyet. m. tanár petefészektümlőt mutat be, melyet 32 éves, vérszegény nőből eredménnyel irtott ki. A tömlő 22 liternyi sűrű, kávébarna színű folyadékot tartalmazott. Egy cseplez-odanövés lekötöttet, a tömlő mellső falának közel két tenyérnyi odanövése lefejtetett. A kocsánycsontok felett a hashártya szűcsvarrattal egyesítettet, melyekbe azonban a hashártya nem öltetett belé. Permetezőt a műtő nem használt. A műtét előtti napon a műtőszobát kénesav-gőzökkel fertőztelenítette, s a műtételnél csak oly vizet használt, mely már fel volt forralva, s az összes vízmennyiség, mely mosdásra stb. szükségeltetett, csak 3 gm. sublimattal volt fertőztelenítve. Hatodnap a hasfali varratok eltávolítottak. A lefolyás egészen láztalan; a műtét nő meggyógyult.

1885. november havi orvosi szakülés.

1. Engel Gábor egyet. m. tanár „Az újszülöttek egyes nyákhártya megbetegedéseinek, névszerint a szájpenész, a Bednárfele fekélyek, a szemkőthártya-takár prophylaxisáról“ értekezik.

Az értekezést egész terjedelmében a jelen füzetben találja a t. olvasó.

1885. december havi orvosi szakülés jegyzőkönyve.

1. Bókai Árpád tanár „Ellenmérég tanulmányok“ cím alatt előadja segédjével Tóthmayer Ferenczel együtt tett vizsgálatainak eredményeit, melyek a paraldehyd szerepére vonatkoznak, brucin, thebain, pikrotoxin, chlorbaryum és phystostigmin mérgezésnél. Előadó ezen dolgozatát a paraldehydről szóló eddigi dolgozatainak folytatásaképpen kéri, hogy tekintessék.

Paraldehyd mint a brucin ellenmérge. Már Husemann említi, hogy a brucint illetőleg az egyes szerzők munkái a legkisebb halálos adagra vonatkozólag fölülte eltérő adatokat tartalmaznak; így a strychninnel összehasonlítva Pelletier a brucint 10-szer, Andral 12-szer Magendie 24-szer és F. A. Falk 38 $\frac{1}{2}$ -szer találta gyengébb hatásúnak. Falk egy kilos házinyúlra 0.023 grmnyi légenysavas brucint vesz fel, mint legkisebb halálos adagot, mely adattal szemben áll Husemann 0.004—0.005 gramnyi adagja. Nem szenvedhet kétséget, hogy a brucinkészítmények különböző tisztaságában kell ennek okát keresni.

A légenysavas brucin, melylyel előadó a mérgezéseket végezte, strychnint nem tartalmazott, mint ezt a vegyi vizsgálat bizonyította, s a brucinnak jellemző kémléseit a legpontosabban mutatta. Hogy azonban a készítmény mindazonáltal vegyileg egészen tiszta brucin nem volt, azt előadó beismerni kötelességének tartja; tudjuk u. i. hogy az igasurin név alatt összefoglalt további 9 alkaloidja az ebvész-