

# EGYETEMET VÉGZETT DEPENDENS BETEGEK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Martinove M, Koprdoová E, Pokora J<sup>1</sup>, Mátyássy A<sup>2</sup>, Kelemen O<sup>2</sup>, Veress A<sup>3</sup>

Psychiatric Clinic for Treatment of Addicts, Predná Hora

<sup>1</sup>Psychiatric Department, Brno

<sup>2</sup>Psychiatric Department County Hospital, Kecskemét

<sup>3</sup>Psychiatric Department, Csíkszereda

## EPIDEMIOLOGICAL INTERNATIONAL PROBE ABOUT UNIVERSITY GRADUATED DEPENDENT PATIENTS

The aim of this study was an epidemiological analysis of university graduated patients with the diagnosis of dependence (ICD-10) from four Central European countries: Slovak Republic, Czech Republic, Hungary and Romania.

We present a sample of 355 out of more as 3469 patients with university education, hospitalised during period from 1997 to 1999 in psychiatric departments or clinics in these countries.

Alcohol is one of the most frequently used substance, used by 91,1% observed patients. Engineers were the most frequent patients with university degree in this group. 62,7% of these patients were still married while treated, what indicates, that the problem of dependence affects not only patients, but also their families.

Obviously alcohol caused the divorce rate of 1/4 of observed group. More than half of dependent (58,6%) is employed while 1/4 (24,9%) of them is unemployed. Somatic comorbidity occurs in

high percentage (42,4%) with liver damage as the most frequent.

**KEYWORDS:** university graduated patients, alcohol addiction, somatic comorbidity

## ÖSSZEFOGLALÁS

Közép-Európából Szlovákia, Csehország, Magyarország és Románia vett részt az epidemiológiai vizsgálatban, ahol egyetemet végzettek alkohol-függőségét vizsgálták. 1997 és 1999 között 355 alkoholfüggő egyetemi diplomást találtak a négy centrumban, összességében 3469 hasonló kórisméjű beteg közül. Azaz az alkoholfüggőségben szenvedők között jelentős számban találhatók egyetemet végzett személyek.

A vizsgált betegek 91,1%-a volt alkoholfüggő, ezen belül a mérnökök voltak a legtöbben (62,7%). Az elváltak aránya 25%, a munkanélkülieké 24,9% volt. Szomatikus tünetek az esetek 42,2%-ában fordultak elő, elsősorban májkárosodás formájában.

**KULCSSZAVAK:** egyetemet végzett betegek, alkoholfüggőség, szomatikus tünetek

